

# Vectra<sup>®</sup> 3D

## Skyddar din hund mot fästingar, loppor och flygande insekter\*, utan bitt

### Förebygger, behandlar och dödar!

Vectra<sup>®</sup> 3D appliceras skonsamt och effektivt med en specialutvecklad pipett direkt på huden.


När parasiterna kommer i kontakt med pälsen, stöts de bort, trillar av och dör. Vectra<sup>®</sup> 3D skyddar din hund mot obehagliga bitt.

**Fast kill  
- no bite!**

1

#### "Hot foot" – effekt

- Stöter bort parasiter.
- Kräver inte bitt för att fungera.



2

#### Dödande effekt

- Fästingar och loppor dör snabbt.
- Har också effekt på loppans ägg och larver.

3

#### Enkel och innovativ pipett

- Den långa pipetten med avrundad topp möjliggör att Vectra<sup>®</sup> 3D når ner på huden.
- Produkten appliceras mothårs.



#### Hunden - en fästingmagnet

Hundar drar till sig fästingar och är ett lätt byte vid en tur i skogen eller parken. Att bli biten av en fästing är det sista vi önskar. De flesta av oss tycker nog att det är obehagligt rent generellt men vi ska också komma ihåg att fästingar kan överföra en mängd sjukdomar när de suger blod från din hund. Fästingar är mycket små, ofta mindre än ett knappnålshuvud, innan de sugit blod. Därför ser vi dem inte alltid. Kontrollera din hund ordentligt efter promenaden.

Borreliosis, anaplasmos och TBE är några av de sjukdomar som överförs av fästingar (s k vektorburna sjukdomar). De kan ge allvarliga symptom och till och med vara dödliga för din hund. Studier visar att upp till 20% av fästingar bär på borrelia. Anmärkningsvärt är också att antalet fästingar ökat markant de sista åren. Det är därför viktigt att du behandlar din hund och förebygger fästingbett i den mån det är möjligt.

Se filmen  
"Applicera Vectra 3D"



Se filmen  
"Så skyddar Vectra 3D"



### Vectra<sup>®</sup> 3D appliceras 1 gång i månaden för att undvika bitt av fästingar och loppor

- 1 förpackning med 3 pipetter
- På marknaden sedan 2008
- Skyddar mer än 1 miljon hundar



Mer information finns i bipacksedeln på [www.fass.se](http://www.fass.se).  
Läs alltid bipacksedeln före användning.



**ANVÄND INTE  
TILL KATT!**



**Receptfritt  
från 2020**



Vectra<sup>®</sup> 3D, dinotefuran, pyriproxyfen, permetrin, spot-on lösning för hund, 1,5-4 kg, >4-10 kg, >10-25, >25-40 kg samt >40 kg ATCvet-kod: QP53AC54 Indikationer: Behandling och förebyggande av loppangrepp. Behandlingen förebygger angrepp av hund- och kattloppor i en månad. Förökningen av loppor förebyggs i två månader efter applicering genom att förhindra vidare utveckling av loppägg, larver och puppor till vuxna loppor. Läkemedlet har avdödande och bortstötande effekt mot angrepp av vanlig fästing och kennelfästing i en månad. Om fästingar finns på djuret när läkemedlet appliceras, kommer eventuellt inte dessa fästingar att avdödas under de första 48 timmarna, men de kommer att avdödas inom en vecka. Stick från sandmyggor, stickmyggor och stickflugor förhindras i en månad efter applicering. Även den avdödande effekten mot stickmyggor och stickflugor kvarstår i en månad. Kontraindikationer: Använd inte till katt. På grund av katters unika fysiologi och oförmåga att bryta ner permetrin, får Vectra 3D inte användas till katter. Om den appliceras på en katt eller intas av en katt som aktivt slickar på en nyligen behandlad hund, kan detta läkemedel ge allvarligt skadliga effekter (dödliga kramper). Dräktighet och laktation: Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation hos tik. Övriga försiktighetsåtgärder: Detta läkemedel kan ge dödliga kramper på katter. Ifall av oavsiktlig exponering, om oönskade effekter uppkommer, tvätta katten med schampo eller tvål och kontakta veterinär omedelbart. Håll katter borta från behandlade hundar tills applikationsstället är torrt. Det är viktigt att se till att katter inte slickar på applikationsstället på en hund som har blivit behandlad med läkemedlet. Kontakta veterinär omedelbart ifall en katt har kommit i kontakt med läkemedlet på detta vis. Säkerheten hos detta läkemedel har inte undersökts hos hundar yngre än 7 veckor eller med en vikt mindre än 1,5 kg. Låt inte läkemedlet komma i kontakt med hundens ögon. Spola omedelbart med vatten vid kontakt med ögon. Läkemedlets effekt bibehålls när behandlade djur kommer i kontakt med vatten (simmor, badar). Reglbunden kontakt med vatten en gång i veckan under en månad och som startar 48 timmar efter behandling, såväl som schamponering 2 veckor efter behandling påverkar inte läkemedlets effekt. Barn får inte hantera behandlade hundar i åtminstone fyra timmar efter administrering av läkemedlet. Därför rekommenderas att behandla hunden på kvällen, eller innan rastning. Hunden bör inte tillåtas att sova tillsammans med barn eller sin ägare under den första behandlingsdygnet. Tvätta händerna grundligt direkt efter användning. Förorena inte dammar, vattendrag eller diken med läkemedlet eller förbrukade applikatorer på grund av att fiskar och andra vattenlevande organismer kan ta skada. Behandlade hundar ska därför inte tillåtas att bada förrän det gått 48 timmar efter behandling. Förpackning: Pappkartong med 3 spot-on applikatorer med 0,8 ml, 1,6 ml, 3,6 ml, 4,7 ml eller 8,0 ml. (Endast en storlek per förpackning). SPC godkänd 2019-06-20. För mer information se [www.fass.se](http://www.fass.se)

